

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Capecitabine+3週毎Trastuzumab
【登録番号】 100132
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:カペシタビン、最小度:トラスツズマブ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):トラスツズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、間質性肺炎、心不全、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、手掌・足底発赤知覚不全症候群

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 27:1999-2006, 2009.

【点滴の時間】 [day1]初回2時間30分, 2回目~1時間30分

【費用】 編集中

【その他】 対象患者:HER2+, トラスツズマブ:投与間隔が4週間を超える場合は8mg/kg/日で投与.

カペシタビン投与量:BSA<1.33m²:3000mg/日, 1.33m²≤BSA<1.57m²:3600mg/日, 1.57m²≤BSA<1.81m²:4200mg/日, BSA≥1.81m²:4800mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	...	15	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	生理食塩液 250mL トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水 20mL 初回8mg/kg、2回目~6mg/kg	1 B - mg/kg 1 A	側管	初回90分、2回目~30分 トラスツズマブ溶解用	○				
3	カペシタビン錠「日医工」 1日目の夕~15日目の朝まで	2500 mg/m ² /日	内服	1日2回朝食後	△	○	△		