

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Capecitabine①B法
【登録番号】 100109
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:カペシタビン
【抗がん剤の組織障害性】 -
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、手掌・足底発赤知覚不全症候群

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 17:485-493, 1999. Cancer 92:1759-1768, 2001. Ann Oncol 14:1227-1233, 2003. J Clin Oncol 23:2155-2161, 2005.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 カペシタビン投与量:BSA<1.33m²:3000mg/日, 1.33m²≤BSA<1.57m²:3600mg/日, 1.57m²≤BSA<1.81m²:4200mg/日, BSA≥1.81m²:4800mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	...	14	...	21
1	カペシタビン錠「日医工」	2500 mg/m ² /日	内服	1日2回朝夕食後	○	○	○		