

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 DTX
【登録番号】 100104
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術前・術後補助:4コースまで、進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:ドセタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、疲労、浮腫、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、脱毛、湿疹、爪変色、爪線状隆起、爪脱落
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 28:2024-2031, 2010. N Engl J Med 358:1663-1671, 2008. J Clin Oncol 23:5542-5551, 2005.
【点滴の時間】 [day1]2時間30分
【費用】 編集中
【その他】 ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		
3	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	1 B 75 mg/m2	側管	1時間	○		