

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** Fulvestrant+Abemaciclib  
**【登録番号】** 100153  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 最小度～軽度:ページニオ, 分類なし:フェソロデックス  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンビシカント(非壊死性):フェソロデックス  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、ほてり、疲労、間質性肺炎、血栓塞栓症、悪心、食欲不振、口腔粘膜炎、下痢、注射部位反応

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** J Clin Oncol 35:2875-2884, 2017.

**【点滴の時間】** -  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:ER+かつHER2- (閉経前で使用する場合にはLH-RHアゴニストを併用する).

day29までは2週間間隔

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	...	15	...	28
1	フェソロデックス筋注	500 mg/回	筋注	左右の臀部に250mgずつ 21～23Gの針	○		○		
2	ページニオ錠	150 mg/回	内服	1日2回	○	○	○	○	○

day29以降は4週間間隔

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	28
1	フェソロデックス筋注	500 mg/回	筋注	左右の臀部に250mgずつ 21～23Gの針	○		
2	ページニオ錠	150 mg/回	内服	1日2回	○	○	○