

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Fulvestrant+Palbociclib
【登録番号】 100152
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:イブランス, 分類なし:フェソロデックス
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):フェソロデックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、ほてり、疲労、間質性肺炎、血栓塞栓症、悪心、食欲不振、口腔粘膜炎、下痢、注射部位反応

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 373:209-219, 2015. Lancet Oncol 17:425-439, 2016. The Oncologist 21:1165-1175, 2016.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:ER+かつHER2- (閉経前で使用する場合にはLH-RHアゴニストを併用する).

day29までは2週間間隔

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	...	15	...	21	...	28
1	フェソロデックス筋注	500 mg/回	筋注	左右の臀部に250mgずつ 21~23Gの針	○		○				
2	イブランスカプセル	125 mg/回	内服	1日1回食後	○	○	○	○	○		

day29以降は4週間間隔

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	...	21	...	28
1	フェソロデックス筋注	500 mg/回	筋注	左右の臀部に250mgずつ 21~23Gの針	○				
2	イブランスカプセル	125 mg/回	内服	1日1回食後	○	○	○		