

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** GEM  
**【登録番号】** 100139  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 軽度:ゲムシタピン  
**【抗がん剤の組織障害性】** イリタント(炎症性):ゲムシタピン  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、発熱、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、湿疹

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Jpn J Clin Oncol 39:699-706, 2009.

**【点滴の時間】** [day1, 8]2時間  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	...	8	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		○		
3	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1250 mg/m2	側管	30分	○		○		