

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Letrozole+Lapatinib
【登録番号】 100146
【1コースの期間】 連日
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:タイケルブ, 分類なし:レトロゾール
【抗がん剤の組織障害性】 -
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 AST増加、ALT増加、血中ビリルビン増加、ほてり、疲労、間質性肺炎、心不全、心電図QT補正間隔延長、血栓塞栓症、口腔粘膜炎、下痢、関節痛、骨粗鬆症、湿疹

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 27:5538-5546, 2009.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:閉経後かつER+かつHER2+.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | |
|--------------------|---------|-----------|------|--------|-----|----|
| | | | | | 連日 | 連日 |
| 1 | レトロゾール錠 | 2.5 mg/回 | 内服 | 1日1回食後 | ○ | ○ |
| 2 | タイケルブ錠 | 1500 mg/回 | 内服 | 1日1回 | ○ | ○ |
| 食事の1時間前から食後1時間を避ける | | | | | | |