

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 TAM+4週毎Goserelin
【登録番号】 100126
【1コースの期間】 連日
【総コース数】 術後補助:5~10年間まで(タモキシフェンは5~10年間、ゾラデックスは2~5年間)、進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 分類なし
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):ゾラデックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 ほてり、間質性肺炎、血栓塞栓症、注射部位反応、無月経、不規則月経、子宮体癌

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 18:2718-2727, 2000. J Clin Oncol 20:4621-4627, 2002. J Clin Oncol 23:5973-5982, 2005. Lancet 369:1711-1723, 2007. J Natl Cancer Inst 101:341-349, 2009. Ann Oncol 22:2216-2226, 2011. Lancet 381:805-816, 2013. J Clin Oncol 32:3948-3958, 2014. N Engl J Med 372:436-46, 2015. J Clin Oncol 19:343-353, 2001.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:閉経前かつER+.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日			
					連日			
1	タモキシフェン錠「日医工」	20 mg/回	内服	1日1回食後	○	○	○	○
2	ゾラデックスデポ	3.6 mg/回	皮下注	前腹部	4週間に1回			