

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** TAM+12週毎Goserelin  
**【登録番号】** 100150  
**【1コースの期間】** 連日  
**【総コース数】** 術後補助:5~10年間まで(タモキシフェンは5~10年間、ゾラデックスは2~5年間)、進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 分類なし  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンビシカント(非壊死性):ゾラデックス  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** ほてり、間質性肺炎、血栓塞栓症、注射部位反応、無月経、不規則月経、子宮体癌

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** J Clin Oncol 18:2718-2727, 2000. J Clin Oncol 20:4621-4627, 2002. J Clin Oncol 23:5973-5982, 2005. Lancet 369:1711-1723, 2007. J Natl Cancer Inst 101:341-349, 2009. Ann Oncol 22:2216-2226, 2011. Lancet 381:805-816, 2013. J Clin Oncol 32:3948-3958, 2014. N Engl J Med 372:436-46, 2015. J Clin Oncol 19:343-353, 2001.

**【点滴の時間】** -  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:閉経前かつER+.

| Rp | 薬剤名           | 量         | 投与方法 | 投与時間   | 投与日     |   |   |   |
|----|---------------|-----------|------|--------|---------|---|---|---|
|    |               |           |      |        | 連日      |   |   |   |
| 1  | タモキシフェン錠「日医工」 | 20 mg/回   | 内服   | 1日1回食後 | ○       | ○ | ○ | ○ |
| 2  | ゾラデックスLAデポ    | 10.8 mg/回 | 皮下注  | 前腹部    | 12週間に1回 |   |   |   |