

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 TC
【登録番号】 100117
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術後補助:4コースまで
【催吐性リスク】 中等度:エンドキサン、軽度:ドセタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル、イリタント(炎症性):エンドキサン
【投与量に制限のある薬剤】 -
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、疲労、浮腫、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、脱毛、湿疹、爪変色、爪線状隆起、爪脱落、出血性膀胱炎
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 24:5381-5387, 2006. J Clin Oncol 27:1177-1183, 2009.
【点滴の時間】 [day1]3時間
【費用】 編集中
【その他】 ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する. エンドキサン:調製後6時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	グラニセトン点滴静注液バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○				
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V							
3	生理食塩液 250mL	1 B	側管	1時間	○				
	ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	75 mg/m ²							
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○				
	注射用エンドキサン	600 mg/m ²							
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後	○	○			