

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 Trastuzumab②3週毎
【登録番号】 100111
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術後補助: 18コースまで(術前にTrastuzumabを使用している場合には、術前と合計して1年間まで)、進行・再発: 制限なし
【催吐性リスク】 最小度: トラスツズマブ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性): トラスツズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 注入に伴う反応、間質性肺炎、心不全

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 354:809-820, 2006. Lancet 369:29-36, 2007. J Clin Oncol 20:719-726, 2002.

【点滴の時間】 [day1]初回2時間30分、2回目～1時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者: HER2+. トラスツズマブ: 投与間隔が4週間を超える場合は8mg/kg/日で投与.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 250mL	1 B	側管	初回90分、2回目～30分	○		
	トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	- mg/kg					
	注射用水 20mL	1 A		トラスツズマブ溶解用			
	初回8mg/kg、2回目～6mg/kg						