

【がん種】 [乳癌](#)
【レジメン名】 VNR+1週毎Trastuzumab
【登録番号】 100112
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 最小度:トラスツズマブ, ロゼウス
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ロゼウス(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止)、ノンビシカント(非壊死性):トラスツズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、間質性肺炎、心不全、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、脱毛、血管炎
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Cancer 110:965-972, 2007. J Clin Oncol 29:264-271, 2010.
【点滴の時間】 [day1]初回3時間10分, 2回目~2時間10分, [day8]2時間10分, [day15]1時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:HER2+, ロゼウス:必要に応じてポートからの投与を考慮する。トラスツズマブ:投与間隔が2週間を超える場合は4mg/kg/日で投与。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	...	8	...	15	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○		
2	生理食塩液 250mL トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水 20mL 初回4mg/kg、2回目~2mg/kg	1 B - mg/kg 1 A	側管	初回90分、2回目~30分 トラスツズマブ溶解用	○		○		○		
3	生理食塩液 50mL ロゼウス静注液	1 B 25 mg/m2	側管	全開	○		○				
4	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	全開	○		○				
5	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○		○				