

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** VNR+3週毎Trastuzumab  
**【登録番号】** 100130  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 最小度:ロゼウス, トラスツズマブ  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):ロゼウス(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止)、ノンビシカント(非壊死性):トラスツズマブ  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、間質性肺炎、心不全、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、脱毛、血管炎  
**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Cancer 110:965-972, 2007. J Clin Oncol 29:264-271, 2010.  
**【点滴の時間】** [day1]初回3時間10分, 2回目~2時間10分、[day8]1時間40分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象:HER2+. ロゼウス:必要に応じてポートからの投与を考慮する. トラスツズマブ:投与間隔が4週間を超える場合は8mg/kg/日で投与.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	...	8	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		
2	生理食塩液 250mL トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水 20mL 初回8mg/kg、2回目~6mg/kg	1 B - mg/kg 1 A	側管	初回90分、2回目~30分  トラスツズマブ溶解用	○				
3	生理食塩液 50mL ロゼウス静注液	1 B 25 mg/m2	側管	全開	○		○		
4	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	全開	○		○		
5	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○		○		