

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** weekly PTX  
**【登録番号】** 100107  
**【1コースの期間】** 1週間  
**【総コース数】** 術前・術後補助:12コースまで、進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 軽度:パクリタキセル  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):パクリタキセル  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、アレルギー反応、傾眠、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** N Engl J Med 358:1663-1671, 2008. N Engl J Med 357:2666-2676, 2007.

**【点滴の時間】** [day1]2時間35分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:アルコール不耐性ではない。  
 パクリタキセル:自然落下投与時は本来の滴数の約1.5倍に設定する。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	7
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前	○		
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 1 A 1 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
5	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 80 mg/m <sup>2</sup>	側管	1時間 フィルター使用(DEHPフリー)	○		