

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** weekly nab-PTX+Atezolizumab  
**【登録番号】** 100157  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 軽度:アブラキサン, 軽度:テセントリク  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):アブラキサン, ノンビシカント(非壊死性):テセントリク  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 白血球減少, 好中球数減少, 貧血, 血小板数減少, AST増加, ALT増加, 下垂体機能低下症, 副腎機能不全, 甲状腺機能亢進症, 甲状腺機能低下症, 高血糖, 注入に伴う反応, サイトカイン放出症候群, 疲労, 黄斑浮腫, 間質性肺炎, 心筋炎, 血栓塞栓症, 消化管穿孔, 悪心, 嘔吐, 食欲不振, 口腔粘膜炎, 味覚異常, 下痢, 便秘, 末梢性感覚ニューロパチー, 末梢性運動ニューロパチー, 筋肉痛, 関節痛, 湿疹, 脱毛  
**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** N Engl J Med 379:2108-2121, 2018.

**【点滴の時間】** [day1]初回3時間10分, 2回目~2時間40分, [day8]2時間10分, [day15]2時間40分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** テセントリク: 正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要.  
 対象患者: PD-L1+かつER-かつPgR-かつHER2-.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	...	8	...	15	...	28		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○				
2	生理食塩液 250mL テセントリク点滴静注	1 B 840 mg	側管	初回1時間, 2回目~30分 フィルター使用	○				○				
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○				○				
4	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		○		○				
5	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○		○		○				
6	生理食塩液 100mL アブラキサン点滴静注	1 B 100 mg/m2	側管	30分 フィルター使用禁止 5mg/mLの濃度に調製	○		○		○				