

**【がん種】** [乳癌](#)  
**【レジメン名】** AC  
**【登録番号】** 100147  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 術前・術後補助:4コースまで(アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)、進行・再発:PDまで(アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)  
**【催吐性リスク】** 高度:AC  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):アドリアシン、イリタント(炎症性):エンドキサン  
**【投与量に制限のある薬剤】** アドリアシン:生涯に500mg/m2まで  
**【主な有害事象】** 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、疲労、間質性肺炎、心不全、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、脱毛、血管炎、出血性膀胱炎、赤～黄色尿

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Cancer 89:2521-2526, 2000. J Clin Oncol 19:931-942, 2001. N Engl J Med 358:1663-1671, 2008. J Clin Oncol 20:3114-3121, 2002.

**【点滴の時間】** [day1]2時間40分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** エンドキサン:調製後6時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○							
2	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○							
3	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○							
4	生理食塩液 100mL アドリアシン注用	1 B 60 mg/m2	側管	全開	○							
5	生理食塩液 100mL 注射用エンドキサン	1 B 600 mg/m2	側管	30分	○							
6	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○						
7	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝食後			○	○				