

【がん種】 [大腸癌](#)
【レジメン名】 Capecitabine+Bmab
【登録番号】 160535
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:カペシタビン、最小度:ペバシズマブ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):ペバシズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、間質性肺炎、高血圧、蛋白尿、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、手掌・足底発赤知覚不全症候群
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 14:1077-1085, 2013.

【点滴の時間】 [day1]初回2時間30分, 2回目2時間, 3回目～1時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者: 大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない.
 カペシタビン投与量: BSA<1.36m²: 2400mg/日, 1.36m²≤BSA<1.66m²: 3000mg/日, 1.66m²≤BSA<1.96m²: 3600mg/日, BSA≥1.96m²: 4200mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	15	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL ペバシズマブBS点滴静注「ファイザー」	1 B 7.5 mg/kg	側管		○								
3	カペシタビン錠「日医工」 1日目の夕～15日目の朝まで	2000 mg/m ² /日	内服	1日2回朝夕食後	△	○	○	○	△				