

【がん種】 **大腸癌**  
 【レジメン名】 FOLFIRI+Bmab  
 【登録番号】 160511  
 【1コースの期間】 2週間  
 【総コース数】 進行・再発:PDまで  
 【催吐性リスク】 中等度:カンプト、軽度:5-FU、最小度:ペバシズマブ  
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):カンプト, 5-FU、ノンビシカント(非壊死性):ペバシズマブ  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注入に伴う反応、疲労、コリン作動性症候群、間質性肺炎、高血圧、蛋白尿、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎症、味覚異常、下痢、便秘、脱毛

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 J Clin Oncol 25:4779-4786, 2007. Lancet Oncol 14:29-37, 2013. Ann Oncol 27:1539-1546, 2016.  
 【点滴の時間】 [day1~]初回51時間5分, 2回目50時間35分, 3回目50時間5分  
 【費用】 編集中  
 【その他】 対象患者: 大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない. 原則, CVポートを増設して治療を行う.

カンプト: UGT1A1に\*6(\*6/\*6), \*28(\*28/\*28), \*6(-/\*6)+\*28(-/\*28)のいずれかの多型がある場合には骨髄抑制が強く出現する.  
 インフューザーポンプの使用可否: CVポートを造設している, 外来で治療する場合(入院導入後に外来へ移行する場合には初回入院時でも使用可能, 外来に移行せずに入院で治療を継続する場合には使用不可).

インフューザーポンプ使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○				
	アロキシ静注 0.75mg	1 V		フィルター使用					
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V							
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	フィルター使用	○				
	ペバシズマブBS点滴静注「ファイザー」	5 mg/kg							
	初回90分、2回目1時間、3回目~30分								
4	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○				
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200 mg/m2		フィルター使用					
	5のカンプトと同時に開始								
5	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	90分	○				
	カンプト点滴静注	150 mg/m2		フィルター使用					
	4のレボホリナートと同時に開始								
6	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○				
	5-FU注	400 mg/m2		フィルター使用					
7	5-FU注	2400 mg/m2	側管	46時間	○				
	インフューザーポンプ使用								
8	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○		

インフューザーポンプ未使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○				
	アロキシ静注 0.75mg	1 V		フィルター使用					
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V							
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	フィルター使用	○				
	ペバシズマブBS点滴静注「ファイザー」	5 mg/kg							
	初回90分、2回目1時間、3回目~30分								
4	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○				
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200 mg/m2		フィルター使用					
	5のカンプトと同時に開始								
5	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	90分	○				
	カンプト点滴静注	150 mg/m2		フィルター使用					
	4のレボホリナートと同時に開始								
6	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○				
	5-FU注	400 mg/m2		フィルター使用					
7	生理食塩液 500mL	1 B	側管	46時間	○				
	5-FU注	2400 mg/m2		フィルター使用					
8	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ		○			
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○		