

【がん種】 [大腸癌](#)
【レジメン名】 SOX+Bmab
【登録番号】 160532
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度:エルプラット、軽度:ティーエスワン、最小度:ペバシズマブ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エルプラット(漏出時の冷却禁止)、ノンビンカント(非壊死性):ペバシズマブ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、注射部位反応注入に伴う反応、アレルギー反応、疲労、流涙、間質性肺炎、高血圧、蛋白尿、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 14:1278-1286, 2013.

【点滴の時間】 [day1]初回5時間, 2回目4時間30分, 3回目~4時間
【費用】 編集中
【その他】 対象患者: 大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない.
 ティーエスワン投与量: BSA<1.25m²: 80mg/日, 1.25m²≤BSA<1.50m²: 100mg/日, BSA≥1.50m²: 120mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	15	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○								
3	生理食塩液 100mL ペバシズマブBS点滴静注「ファイザー」 初回90分、2回目1時間、3回目~30分	1 B 7.5 mg/kg	側管		○								
4	5%ブドウ糖液 500mL エルプラット点滴静注液	1 B 130 mg/m ²	側管	2時間	○								
5	ティーエスワン配合OD錠 1日目の夕~15日目の朝まで	80 mg/m ² /日	内服	1日2回朝夕食後	△	○	○	○	△				
6	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○						