

【がん種】 [大腸癌](#)
【レジメン名】 Nivolumab+Ipilimumab
【登録番号】 160552
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:4コースまで(終了後にPDでなければNivolumab①2週毎 or Nivolumab②4週毎を施行する)
【催吐性リスク】 最小度:オプジーボ、ヤーボイ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンシカント(非壊死性):オプジーボ、ヤーボイ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 AST増加、ALT増加、下垂体機能低下症、副腎機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、高血糖、注入に伴う反応、サイトカイン放出症候群、疲労、間質性肺炎、心筋炎、血栓塞栓症、消化管穿孔、食欲不振、下痢、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、湿疹
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 36:773-779, 2018.

【点滴の時間】 [day1]2時間30分
【費用】 編集中
【その他】 ヤーボイ:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要。
 対象患者:MSI Highかつフツ化ピリミジン系、オキサリプラチン及びイリノテカンによる治療歴がある。

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | |
|----|--------------------------|------------------|------|--------------------------------|-----|-----|----|
| | | | | | 1 | ... | 21 |
| 1 | 生理食塩液 250mL | 1 B | メイン | キープ&フラッシュ | ○ | | |
| 2 | 生理食塩液 100mL オプジーボ点滴静注 | 1 B 240 mg | 側管 | 30分 フィルター使用 シリコン製ポート使用禁止 | ○ | | |
| 3 | 生理食塩液 50mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | | |
| 4 | 生理食塩液 100mL ヤーボイ点滴静注液 | 20 mL 1 mg/kg | 側管 | 30分 フィルター使用 | ○ | | |