

【がん種】 [大腸癌](#)
【レジメン名】 Encorafenib+Binimetinib+Cmab
【登録番号】 160553
【1コースの期間】 1週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度～高度:ピラフトビ, メクトビ, 最小度:アービタックス
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):アービタックス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 貧血、低マグネシウム血症、CPK増加、疲労、注入に伴う反応、霧視、眼障害 その他、駆出率減少、間質性肺炎、悪心、嘔吐、口腔粘膜炎、下痢、便秘、筋肉痛、横紋筋融解症、脱毛、ざ瘡様皮疹、そう痒症、皮膚乾燥、皮膚疼痛、手掌・足底知覚不全症候群、爪囲炎
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 381:1632-1643, 2019.

【点滴の時間】 [day1]初回4時間30分, 2回目～3時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者: BRAF V600E変異+かつRAS遺伝子変異一.
 ピラフトビ, メクトビ: 正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	7
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V			○		
	ポラミン注 5mg/1mL	1 A			○		
3	生理食塩液 250mL アービタックス注射液 初回400mg/m2、2回目～250mg/m2	1 B - mg/m2	側管	初回2時間、2回目～1時間	○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	1時間	○		
5	ピラフトビカプセル	300 mg	内服	1日1回食後	○	○	○
6	メクトビ錠	90 mg	内服	1日2回朝夕食後	○	○	○