

【がん種】 [食道癌](#)
【レジメン名】 Nivolumab②4週毎
【登録番号】 100412
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 最小度:オブジーボ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):オブジーボ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 AST増加、ALT増加、下垂体機能低下症、副腎機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、高血糖、注入に伴う反応、サイトカイン放出症候群、疲労、間質性肺炎、心筋炎、血栓塞栓症、消化管穿孔、食欲不振、下痢、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、湿疹
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 20:1506-1517, 2019. Ann Oncol 29: 2208-2213, 2018. Ann Oncol 30:644-651, 2019. Ann Oncol 31:302-309, 2020.
【点滴の時間】 [day1]2時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL オブジーボ点滴静注	1 B 480 mg	側管	30分 フィルター使用 シリコン製ポート使用禁止	○		