

**【がん種】** [胃癌](#)  
**【レジメン名】** weekly PTX+Rmab  
**【登録番号】** 160722  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【総コース数】** 進行・再発:PDまで  
**【催吐性リスク】** 軽度:パクリタキセル、最小度:サイラムザ  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):パクリタキセル、イリタント(炎症性):サイラムザ  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Lancet Oncol 15:1224-1235, 2014.

**【点滴の時間】** [day1]初回3時間35分、2回目3時間5分、[day8]2時間35分、[day15]3時間5分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:アルコール不耐性ではない。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	...	8	...	15	...	28	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○			
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 サイラムザ投与30分前	○				○			
3	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前			○					
4	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 1 A 1 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○		○		○			
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		○		○			
6	生理食塩液 250mL サイラムザ点滴静注液 調製開始から13時間以内に投与終了	1 B 8 mg/kg	側管	初回1時間、2回目~30分 フィルター使用	○				○			
7	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 80 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用(DEHPフリー)	○		○		○			