

**【がん種】** [胃癌](#)  
**【レジメン名】** CapeOX  
**【登録番号】** 160724  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 術後補助:8コース  
**【催吐性リスク】** 中等度:エルプラット、軽度:カペシタビン  
**【抗がん剤の組織障害性】** イリタント(炎症性):エルプラット(漏出時の冷却禁止)  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Lancet 379:315-321, 2012.

**【点滴の時間】** [day1]3時間30分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** カペシタビン投与量:BSA<1.36m<sup>2</sup>:2400mg/日, 1.36m<sup>2</sup>≤BSA<1.66m<sup>2</sup>:3000mg/日, 1.66m<sup>2</sup>≤BSA<1.96m<sup>2</sup>:3600mg/日, BSA≥1.96m<sup>2</sup>:4200mg/日.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	15	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○								
3	5%ブドウ糖液 500mL エルプラット点滴静注液	1 B 130 mg/m <sup>2</sup>	側管	2時間	○								
4	カペシタビン錠「日医工」 1日目の夕～15日目の朝まで	2000 mg/m <sup>2</sup> /日	内服	1日2回朝食後	△	○	○	○	△				
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○	○						