

【がん種】 [肝癌](#)
【レジメン名】 Cabozantinib
【登録番号】 060912
【1コースの期間】 連日
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 最小度～軽度:カボメティクス
【抗がん剤の組織障害性】 -
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、AST増加、ALT増加、血中ビリルビン増加、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、疲労、嘔声、間質性肺炎、高血圧、蛋白尿、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、食欲不振、口腔粘膜炎、顎骨壊死、下痢、湿疹、手掌・足底発赤知覚不全症候群
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 379:54-63, 2018.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 対象患者: Child Pugh Score A.
 カボメティクス: 正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日	
					連日	連日
1	カボメティクス錠 食事の1時間前から食後2時間以内を避ける	60 mg/回	内服	1日1回	○	○