

【がん種】 [肝癌](#)
【レジメン名】 Bmab+Atezolizumab
【登録番号】 060910
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:テセントリク、最小度:アバスチン
【抗がん剤の組織障害性】 非壊死性(ノンビシカント):テセントリク, アバスチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 AST増加、ALT増加、下垂体機能低下症、副腎機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、高血糖、注入に伴う反応、サイトカイン放出症候群、疲労、間質性肺炎、心筋炎、高血圧、蛋白尿、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、食欲不振、下痢、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、湿疹
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 382:1894-1905, 2020.
【点滴の時間】 [day1]初回3時間35分、2回目～2時間35分、3回目～2時間5分
【費用】 編集中
【その他】 テセントリク:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 250mL テセントリク点滴静注	1 B 1200 mg	側管	初回1時間、2回目～30分 フィルター使用	○		
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○		
4	生理食塩液 100mL アバスチン点滴静注用	1 B 15 mg/kg	側管		○		
初回90分、2回目1時間、3回目～30分							