

**【がん種】** [悪性黒色腫](#)  
**【レジメン名】** Ipilimumab  
**【登録番号】** 300004  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 進行・再発:4コースまで  
**【催吐性リスク】** 最小度:ヤーボイ  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンビシカント(非壊死性):ヤーボイ  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** AST増加、ALT増加、下垂体機能低下症、副腎機能不全、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、高血糖、注入に伴う反応、サイトカイン放出症候群、疲労、間質性肺炎、心筋炎、血栓塞栓症、消化管穿孔、食欲不振、下痢、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、湿疹  
**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** N Engl J Med 363:711-723, 2010. N Engl J Med 373:23-34, 2015.  
**【点滴の時間】** [day1]2時間30分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** ヤーボイ:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL ヤーボイ点滴静注液	20 mL 3 mg/kg	側管	90分 フィルター使用	○		