

【がん種】 [非小細胞肺癌](#)
 【レジメン名】 PEM+Bmabメンテナンス
 【登録番号】 100230
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで(CDDP+PEM+Bmab終了後から)
 【催吐性リスク】 軽度:アリムタ、最小度:ペバシズマブ
 【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):ペバシズマブ, アリムタ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 31:3004-3011, 2013.

【点滴の時間】 [day1]初回3時間10分、2回目2時間40分、3回目～2時間10分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者: 非扁平上皮癌, 大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない.
 アリムタ: 投与直前に溶解.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	調剤用 バンピタン末 アリムタ初回投与の7日以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服用する	1 g/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○
2	ビタミンB12注 1000 μg/1mL アリムタ初回投与の7日以上前に投与し、最終投与日から22日目まで9週間毎に投与する	1 A	筋注		9週間毎		
3	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
4	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		
5	生理食塩液 100mL ペバシズマブBS点滴静注「ファイザー」 初回90分、2回目1時間、3回目～30分	1 B 7.5 mg/kg	側管		○		
6	生理食塩液 100mL アリムタ注射用	1 B 500 mg/m2	側管	10分	○		