

【がん種】 [非小細胞肺癌](#)
 【レジメン名】 DTX+Rmab
 【登録番号】 100236
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで
 【催吐性リスク】 軽度:ドセタキセル、最小度:サイラムザ
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ドセタキセル、イリタント(炎症性):サイラムザ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Lancet 384:665-673, 2014.

【点滴の時間】 [day1]初回3時間30分, 2回目~3時間
 【費用】 編集中
 【その他】 ドセタキセル:最大75mg/m2で投与可能.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 サイラムザ投与30分前	○		
3	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分 開始時にレスタミン内服	○		
4	生理食塩液 250mL サイラムザ点滴静注液 調製開始から13時間以内に投与終了	1 B 10 mg/kg	側管	初回1時間、2回目~30分 フィルター使用	○		
5	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」 調製開始から4時間以内に投与終了	1 B 60 mg/m2	側管	1時間	○		