

【がん種】 [非小細胞肺癌](#)
 【レジメン名】 CBDCA+weekly nab-PTX+Pembrolizumab
 【登録番号】 100242
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:4コースまで(終了後にPDでなければPembolizumabを施行する)
 【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン、軽度:アブラキサン、最小度:キイトルーダ
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):アブラキサン、イリタント(炎症性):カルボプラチン、ノンビシカント(非壊死性):キイトルーダ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 N Engl J Med 379:2040-2051, 2018.

【点滴の時間】 [day1]3時間45分、[day8, 15]2時間5分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:扁平上皮癌。

アブラキサン:特定生物由来製品であり、同意を取得する。カルボプラチン:アルミニウムが用いられている機器の使用禁止。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	2	3	...	8	...	15	...	21							
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○															
2	生理食塩液 50mL キイトルーダ点滴静注 調製開始から6時間以内に投与終了	1 B 200 mg	側管	30分 フィルター使用	○															
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○															
4	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○															
5	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○															
6	生理食塩液 100mL アブラキサン点滴静注用 投与直前に調製	1 B 100 mg/m2	側管	30分 フィルター使用禁止 5mg/mLの濃度に調製	○															
7	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○															
8	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B AUC6	側管	1時間	○															
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○													
10	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ						○				○						
11	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分						○				○						
12	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開						○				○						
13	生理食塩液 100mL アブラキサン点滴静注用 投与直前に調製	1 B 100 mg/m2	側管	30分 フィルター使用禁止 5mg/mLの濃度に調製						○				○						