

【がん種】 [肺癌](#)
【レジメン名】 FOLFIRINOX
【登録番号】 160604
【1コースの期間】 2週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 高度:FOLFIRINOX
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エルブラット(漏出時の冷却禁止), カンプト, 5-FU
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、アレルギー反応、疲労、コリン作動性症候群、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、脱毛、注射部位反応
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 364:1817-1825, 2011. Cancer Sci 105:1321-1326, 2014.

【点滴の時間】 [day1~]52時間5分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者: UGT1A1に*6(*6/*6), *28(*28/*28), *6(-/*6)+*28(-/*28)のいずれかの多型がない。原則、CVポートを増設して治療を行う。
携帯型ポンプの使用可否: CVポートを造設している、外来で治療する場合(入院導入後に外来へ移行する場合には初回入院時も使用可能、外来に移行せずに入院で治療を継続する場合には使用不可)。

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日										
					1	2	3	4	...	14					
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○										
2	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○										
	フロイメンド点滴静注用 150mg	1 V													フィルター使用
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○										
	アロキン静注 0.75mg	1 V													フィルター使用
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A													
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
4	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○										
	エルブラット点滴静注液	85 mg/m2													フィルター使用
5	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○										
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200 mg/m2													フィルター使用
6	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	90分	○										
	カンプト点滴静注	180 mg/m2													フィルター使用
5のレボホリナート開始30分後に開始															
7	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○										
	5-FU注	400 mg/m2													フィルター使用
8	5-FU注	2400 mg/m2	メイン	46時間	○										
	携帯型ポンプ使用														
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○									
10	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝食後			○	○							

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ未使用時

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日										
					1	2	3	4	...	14					
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○										
2	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○										
	フロイメンド点滴静注用 150mg	1 V													フィルター使用
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○										
	アロキン静注 0.75mg	1 V													フィルター使用
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A													
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
4	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○										
	エルブラット点滴静注液	85 mg/m2													フィルター使用
5	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	2時間	○										
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	200 mg/m2													フィルター使用
6	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	90分	○										
	カンプト点滴静注	180 mg/m2													フィルター使用
5のレボホリナート開始30分後に開始															
7	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○										
	5-FU注	400 mg/m2													フィルター使用
8	生理食塩液 500mL	1 B	側管	46時間	○										
	5-FU注	2400 mg/m2													フィルター使用
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○									
10	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝食後			○	○							