

【がん種】 [膀胱癌](#)
【レジメン名】 GEM
【登録番号】 160601
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 術後補助:6コースまで、進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:ゲムシタピン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ゲムシタピン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、発熱、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、湿疹

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 JAMA 297:267-277, 2007. J Clin Oncol 15:2403-2413, 1997. N Engl J Med 364:1817-1825, 2011. J Clin Oncol 31:1640-1648, 2013.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15]2時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	...	8	...	15	...	28	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○			
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		○		○			
3	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○		○		○			