

【がん種】 [肺癌](#)
【レジメン名】 GEM+nab-PTX
【登録番号】 160605
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度: GEM+nab-PTX
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):アブラキサン、イリタント(炎症性):ゲムシタピン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、発熱、疲労、黄斑浮腫、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚異常、下痢、便秘、末梢性感覚ニューロパチー、末梢性運動ニューロパチー、筋肉痛、関節痛、脱毛、湿疹
【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 369:1691-1703, 2013.
【点滴の時間】 [day1, 8, 15]2時間40分
【費用】 編集中
【その他】 アブラキサン:投与直前に溶解.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	...	8	...	15	...	28	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○			
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 1 V	側管	30分	○		○		○			
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○		○		○			
4	生理食塩液 100mL アブラキサン点滴静注用	1 B 125 mg/m2	側管	30分 フィルター使用禁止 5mg/mLの濃度に調製	○		○		○			
5	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○		○		○			
6	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○		○		○			