

【がん種】 [急性骨髄性白血病](#)  
 【レジメン名】 Azacitidine①皮下注射  
 【登録番号】 011508  
 【1コースの期間】 4週間  
 【総コース数】 PDまで  
 【催吐性リスク】 中等度:ピダーザ  
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ピダーザ  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 Blood 126:291-299, 2015. N Engl J Med 383:617-629, 2020.

【点滴の時間】 -  
 【費用】 編集中  
 【その他】 ピダーザ投与時の注意点:総量4mLを超える場合には2本シリンジに2等分して2カ所に投与する, 25Gの針を使用する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	3	4	5	6	7	...	28				
1	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ピダーザ投与1時間前	○	○	○	○	○	○	○	○					
2	注射用水 20mL ピダーザ注射用 懸濁液を均一にしてから投与 調製開始から1時間以内に投与終了	1 A 75 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	AM9:00 25Gの針 腹部、大腿部、上腕 25mg/mLの濃度に調製	○	○	○	○	○	○	○						