

【がん種】 [急性骨髄性白血病](#)  
 【レジメン名】 Azacitidine②点滴静注  
 【登録番号】 011509  
 【1コースの期間】 4週間  
 【総コース数】 PDまで  
 【催吐性リスク】 中等度:ビダーザ  
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ビダーザ  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 Blood 126:291-299, 2015. N Engl J Med 383:617-629, 2020.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]1時間10分  
 【費用】 編集中  
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	3	4	5	6	7	...	28				
1	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ビダーザ投与1時間前	○	○	○	○	○	○	○	○					
2	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○	○	○	○	○	○					
3	生理食塩液 50mL ビダーザ注射用 蒸留水 100mL	1 B 75 mg/m2 1 B	側管	10分 AM9:00~ ビダーザ溶解用	○	○	○	○	○	○	○	○					
調製開始から1時間以内に投与終了																	