【がん種】 急性骨髄性白血病
【レジメン名】 Azacitidine皮下+Venetoclax①1コース目
【登録番号】 011510
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 1コースまで(終了後にPDでなければAzacitidine皮下+Venetoclax②2コース目～を施行する)
【催吐性リスク】 中等度:ビダーザ、最小度～軽度:ベネクレクスタ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ビダーザ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 383:617-629, 2020.

【点滴の時間】 [day0～]105時間
【費用】 編集中
【その他】 ビダーザ投与時の注意点:総量4mLを超える場合には2本シリンジに2等分して2ヵ所に投与する, 25Gの針を使用する.
ベネクレクスタ:限定薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					0	1	2	3	4	5	6	7	…	28
1	フェブリク錠20mg	3 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○			
2	ソルデム1 500mL	1 B	メイン	8時間 AM0:00～		○	○	○	○					
3	ソルデム1 500mL	1 B	メイン	8時間 AM8:00～		○	○	○	○					
4	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ビダーザ投与1時間前		○	○	○	○	○	○	○		
5	ベネクレクスタ錠	100 mg	内服	1日1回朝食後		○								
6	ベネクレクスタ錠	200 mg	内服	1日1回朝食後			○							
7	ベネクレクスタ錠	400 mg	内服	1日1回朝食後				○	○	○	○	○	○	○
8	注射用水 20mL ビダーザ注射用 懸濁液を均一にしてから投与 調製開始から1時間以内に投与終了	1 A 75 mg/m2	皮下注	AM9:00 25Gの針 腹部、大腿部、上腕 25mg/mLの濃度に調製		○	○	○	○	○	○	○		
9	ソルデム1 500mL	1 B	メイン	8時間 PM16:00～	○	○	○	○	○					