

【がん種】 [急性骨髄性白血病](#)  
 【レジメン名】 Azacitidine皮下+Venetoclax②2コース目～  
 【登録番号】 011511  
 【1コースの期間】 4週間  
 【総コース数】 PDまで(Azacitidine皮下+Venetoclax①1コース目終了後から)  
 【催吐性リスク】 中等度:ピダーザ、最小度～軽度:ベネクレクタ  
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ピダーザ  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 N Engl J Med 383:617-629, 2020.

【点滴の時間】 -  
 【費用】 編集中  
 【その他】 ピダーザ投与時の注意点:総量4mLを超える場合には2本シリンジに2等分して2カ所に投与する。25Gの針を使用する。  
 ベネクレクタ:限定薬品.

| Rp | 薬剤名   | 量                           | 投与方法 | 投与時間                                       | 投与日 |   |   |   |   |   |   |     |    |  |
|----|---|-----------------------------|------|--|-----|---|---|---|---|---|---|-----|----|--|
|    |   |                             |      |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 28 |  |
| 1  | カイトリル錠 2mg  | 1 錠/回                       | 内服   | 1日1回 AM8:00<br>ピダーザ投与1時間前                  | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |     |    |  |
| 2  | ベネクレクタ錠   | 400 mg                      | 内服   | 1日1回朝食後                                    | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |     |    |  |
| 3  | 注射用水 20mL<br>ピダーザ注射用<br>懸濁液を均一にしてから投与<br>調製開始から1時間以内に投与終了 | 1 A<br>75 mg/m <sup>2</sup> | 皮下注  | AM9:00 25Gの針<br>腹部、大腿部、上腕<br>25mg/mLの濃度に調製 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |     |    |  |