【がん種】 急性骨髄性白血病
【レジメン名】 Azacitidine点滴+Venetoclax①1コース目
【登録番号】 011512
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 1コースまで(終了後にPDでなければAzacitidine点滴+Venetoclax②2コース目～を施行する)
【催吐性リスク】 中等度:ビダーザ、最小度～軽度:ベネクレクスタ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ビダーザ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 383:617-629, 2020.

【点滴の時間】 [day0～]105時間、[day5, 6, 7]1時間10分
【費用】 編集中
【その他】 ベネクレクスタ:限定薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					0	1	2	3	4	5	6	7	…	28
1	フェブリク錠20mg	3 錠/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○			
2	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○	○	○	○					
3	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ						○	○	○		
4	ソルデム1 500mL	1 B	側管	8時間 AM0:00～		○	○	○	○					
5	生理食塩液 500mL	1 B	側管	8時間 AM8:00～		○	○	○	○					
6	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ビダーザ投与1時間前		○	○	○	○	○	○	○		
7	ベネクレクスタ錠	100 mg	内服	1日1回朝食後		○								
8	ベネクレクスタ錠	200 mg	内服	1日1回朝食後			○							
9	ベネクレクスタ錠	400 mg	内服	1日1回朝食後				○	○	○	○	○	○	○
10	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開 フラッシュ用		○	○	○	○					
11	生理食塩液 50mL ビダーザ注射用 蒸留水 100mL ビダーザ投与中はソルデム1は止める 調製開始から1時間以内に投与終了	1 B 75 mg/m2 1 B	側管	10分 AM9:00～ ビダーザ溶解用		○	○	○	○	○	○	○		
12	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開 フラッシュ用		○	○	○	○					
13	ソルデム1 500mL	1 B	側管	8時間 PM16:00～	○	○	○	○	○					