【がん種】 急性骨髄性白血病
【レジメン名】 Azacitidine点滴+Venetoclax②2コース目～
【登録番号】 011513
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 1コースまで(Azacitidine点滴+Venetoclax①1コース目終了後から)
【催吐性リスク】 中等度:ビダーザ、最小度～軽度:ベネクレクスタ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ビダーザ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 383:617-629, 2020.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]1時間10分
【費用】 編集中
【その他】 ベネクレクスタ:限定薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	4	5	6	7	…	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○	○	○	○	○	○		
2	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ビダーザ投与1時間前	○	○	○	○	○	○	○		
3	ベネクレクスタ錠	400 mg	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	生理食塩液 50mL ビダーザ注射用 蒸留水 100mL 調製開始から1時間以内に投与終了	1 B 75 mg/m2 1 B	側管	10分 AM9:00～ ビダーザ溶解用	○	○	○	○	○	○	○		