

【がん種】 [急性骨髄性白血病](#)
 【レジメン名】 LDAC+ACR①65歳未満
 【登録番号】 011502
 【1コースの期間】 -
 【総コース数】 PDまで
 【催吐性リスク】 軽度:low dose Ara-C+ACR
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):アクラシノン、ノンシカント(非壊死性):キロサイド
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Int J Hematol 71:238-244, 2000.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3, 4]2時間
 【費用】 編集中
 【その他】 アクラシノン:調製後3時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					
					1	2	3	4	...	14
1	キロサイド注	10 mg/m ²	皮下注	AM9:00 27Gの針 腹部、大腿部、上腕	○	○	○	○	○	○
2	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○	○		
3	グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分 AM9:00	○	○	○	○		
4	生理食塩液 100mL アクラシノン注射用	1 B 14 mg/m ²	側管	30分	○	○	○	○		
5	キロサイド注	10 mg/m ²	皮下注	PM9:00 27Gの針 腹部、大腿部、上腕	○	○	○	○	○	○