

【がん種】 [慢性リンパ性白血病](#)  
 【レジメン名】 FC  
 【登録番号】 011803  
 【1コースの期間】 4週間  
 【総コース数】 6コースまで  
 【催吐性リスク】 中等度:エンドキサン、最小度:フルダラ  
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エンドキサン、ノンビンカント(非壊死性):フルダラ  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 Blood 107:885-891, 2006. J Clin Oncol 25:793-798, 2007. Lancet 370:230-239, 2007.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3]2時間30分  
 【費用】 編集中  
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○		
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○				
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 A 1 V	側管	30分		○	○		
3	生理食塩液 100mL フルダラ静注用 蒸留水 100mL	1 B 25 mg/m2 1 B	側管	30分 フルダラ溶解用	○	○	○		
4	生理食塩液 100mL 注射用エンドキサン	1 B 250 mg/m2	側管	30分	○	○	○		