

【がん種】 [骨髄異形成症候群](#)  
 【レジメン名】 Azacitidine①皮下注射  
 【登録番号】 011601  
 【1コースの期間】 4週間  
 【総コース数】 PDまで  
 【催吐性リスク】 中等度:ピダーザ  
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ピダーザ  
 【投与量に制限のある薬剤】 なし  
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中  
 【根拠論文】 J Clin Oncol 20:2429-2440, 2002. J Clin Oncol 20:2441-2452, 2002. Lancet Oncol 10:223-232, 2009.

【点滴の時間】 -  
 【費用】 編集中  
 【その他】 対象患者:IPSS分類でInt-2又はHigh. ピダーザ投与時の注意点:総量4mLを超える場合には2本シリンジに2等分して2カ所に投与する, 25Gの針を使用する.  
 ピダーザ:調製後1時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	5	6	7	...	28	
1	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ピダーザ投与1時間前	○	○	○	○	○	○	○			
2	注射用水 20mL ピダーザ注射用 懸濁液を均一にしてから投与	1 A 75 mg/m2	皮下注	AM9:00 25Gの針 腹部、大腿部、上腕 25mg/mLの濃度に調製	○	○	○	○	○	○	○			