【がん種】 骨髄異形成症候群
【レジメン名】 Azacitidine②点滴静注
【登録番号】 011602
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 PDまで
【催吐性リスク】 中等度:ビダーザ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ビダーザ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 20:2429-2440, 2002. J Clin Oncol 20:2441-2452, 2002. Lancet Oncol 10:223-232, 2009.

【点滴の時間】 -
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:IPSS分類でInt-2又はHigh. ビダーザ:調製後1時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	4	5	6	7	…	28
1	カイトリル錠 2mg	1 錠/回	内服	1日1回 AM8:00 ビダーザ投与1時間前	○	○	○	○	○	○	○		
2	生理食塩液 100mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○	○	○	○	○	○		
3	生理食塩液 50mL ビダーザ注射用 蒸留水 100mL	1 B 75 mg/m2 1 B	側管	10分 AM9:00～ ビダーザ溶解用	○	○	○	○	○	○	○		