【がん種】 ホジキンリンパ腫
【レジメン名】 Brentuximab Vedotin+AVD
【登録番号】 011209
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 6コースまで(アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)
【催吐性リスク】 高度:ダカルバジン、中等度:アドリアシン、軽度:アドセトリス、最小度:エクザール
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):エクザール(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止), アドリアシン、イリタント(炎症性):ダカルバジン、ノンビシカント(非壊死性):アドセトリス
【投与量に制限のある薬剤】 エクザール:1回に10mg/bodyまで、アドリアシン:生涯に500mg/m2まで、アドセトリス:1回に120mg/bodyまで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 N Engl J Med 378:331-344, 2018.

【点滴の時間】 [day1, 15]3時間20分
【費用】 編集中
【その他】 アドセトリス:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要. 25mg未満の場合は生理食塩液50mLに希釈する(添付文書上最終濃度0.4～1.2mg/mLだが, 0.2～1.8mg/mLで24時間安定).
対象患者:CD30+.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日									
					1	2	3	4	…	15	16	17	18	…	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○					○					
2	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○					○					
	プロイメンド点滴静注用 150mg	1 V													
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○					○					
	アロキシ静注 0.75mg	1 V													
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A													
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V													
4	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○					○					
	エクザール注射用	6 mg/m2													
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	全開	○					○					
	アドリアシン注用	25 mg/m2													
6	生理食塩液 250mL	100 mL	側管	30分	○					○					
	ダカルバジン注用	375 mg/m2		ルート+ボトルを遮光											
	蒸留水 100mL	1 B		ダカルバジン溶解用											
	調製開始から8時間以内に投与終了														
7	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○					○					
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○					○					
	アドセトリス点滴静注用	1.2 mg/kg													
	蒸留水 100mL	1 B		アドセトリス溶解用											
9	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○					○				
10	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝昼食後			○	○				○	○		