

【がん種】 [ホジキンリンパ腫](#)
【レジメン名】 Brentuximab Vedotin
【登録番号】 011203
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 16コース
【催吐性リスク】 軽度:アドセトリス
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):アドセトリス
【投与量に制限のある薬剤】 アドセトリス:1回に180mg/bodyまで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 30:2183-2189, 2012. Cancer Sci 105 840-846, 2014.

【点滴の時間】 [day1]2時間
【費用】 編集中
【その他】 アドセトリス:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要。25mg未満の場合は生理食塩液50mLに希釈する(添付文書上最終濃度0.4~1.2mg/mLだが、0.2~1.8mg/mLで24時間安定)。
 対象患者:CD30+.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V					
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
	アドセトリス点滴静注用	1.8 mg/kg					
	蒸留水 100mL	1 B					