【がん種】 ホジキンリンパ腫
【レジメン名】 GCD
【登録番号】 011205
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 4コースまで
【催吐性リスク】 中等度：カルボプラチン、軽度：ゲムシタビン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ゲムシタビン, カルボプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Leukemia & Lymphoma 51:1523–1529, 2010.

【点滴の時間】 [day1]3時間、[day8]2時間
【費用】 編集中
【その他】 –

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	…	8	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○							
2	グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	5 V										
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○							
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2										
4	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	側管	1時間	○							
	カルボプラチン点滴静注液「NK」	AUC5										
5	デカドロン錠 4mg	10 錠/回	内服	1日1回朝食後		○	○	○				
6	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ						○		
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分						○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V										
8	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分						○		
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2										