

【がん種】 [悪性黒色腫](#)
 【レジメン名】 DTIC
 【登録番号】 300003
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで
 【催吐性リスク】 高度:ダカルバジン
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ダカルバジン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 17:2745-2751, 1999. Lancet 380: 358-365, 2012. Lancet Oncol 16:375-384, 2015. N Engl J Med 372:320-330, 2015.

【点滴の時間】 [day1]4時間
 【費用】 編集中
 【その他】 ダカルバジン:調製後8時間以内に投与を終了する。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	4	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○						
2	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○						
3	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○						
4	生理食塩液 500mL ダカルバジン注用 蒸留水 100mL	1 B 1000 mg/m2 2 B	側管	2時間 ルート+ボトルを遮光 ダカルバジン溶解用	○						
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○					
6	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝食後			○	○			