

**【がん種】** [悪性軟部腫瘍](#)  
**【レジメン名】** DXR  
**【登録番号】** 500000  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 進行・再発:6コースまで(アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)  
**【催吐性リスク】** 中等度:アドリアシン  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):アドリアシン  
**【投与量に制限のある薬剤】** アドリアシン:生涯に500mg/m2まで  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Br J Cancer 78:1634-1639, 1998. J Clin Oncol 25:3144-3150, 2007. Lancet Oncol 15:415-423, 2014.

**【点滴の時間】** [day1]1時間40分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○				
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V							
3	生理食塩液 100mL	1 B	側管	全開	○				
	アドリアシン注用	75 mg/m2							
4	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後	○	○			