

【がん種】 [悪性軟部腫瘍](#)
【レジメン名】 Trabectedin
【登録番号】 500003
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 中等度:ヨンデリス
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):ヨンデリス
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 34:786-793, 2015. Lancet Oncol 16:406-416, 2015.

【点滴の時間】 [day1]25時間30分
【費用】 編集中
【その他】 ヨンデリス:正式採用品ではないため「限定使用薬品申請書」の薬剤部への提出が必要, 中心静脈から投与する, 調製後30時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分 中心静脈注射 フィルター使用	○				
	アロキン静注 0.75mg	1 V							
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A							
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	2 V							
3	生理食塩液 500mL	1 B	側管	24時間 フィルター使用 中心静脈注射	○				
	ヨンデリス点滴静注用	1.2 mg/m ²							
4	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○		