

【がん種】 [悪性軟部腫瘍](#)
【レジメン名】 weekly PTX
【登録番号】 500004
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで
【催吐性リスク】 軽度:パクリタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):パクリタキセル
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 26:5269-5274, 2008.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15]2時間35分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:アルコール不耐性ではない, 血管肉腫.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	...	8	...	15	...	28	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○			
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前	○		○		○			
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 1 A 1 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○		○		○			
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		○		○			
5	生理食塩液 250mL パクリタキセル注「NK」	1 B 80 mg/m2	側管	1時間 フィルター使用(DEHPフリー)	○		○		○			